

Handzettel


7 Der zentrale Grenzwertsatz (Fortsetzung)

(Kapitel 7 in Bovier Skript)

Definition 1. Sei X eine reelle Z.V.. Dann die charakteristische Funktion von X definiert durch

$$\phi(t) = \phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \mathbb{E}[\cos(tX)] + i \mathbb{E}[\sin(tX)].$$

Satz 6. Die charakteristische Funktion einer Z.V. legt deren Verteilung eindeutig fest.



Lemma 7. Sei $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Dann

$$\phi_X(t) = \exp(-t^2 \sigma^2 / 2).$$

Satz 8. Sei ϕ die char. Fkt. einer Z.V. X mit Verteilung μ .

a) Dann $\forall a < b$:

$$\mu((a, b)) + \frac{1}{2} \mu(\{a, b\}) = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt.$$

b) Falls $\int |\phi(t)| dt < \infty$ dann μ ist absolut stetig bzgl. Lebesgue mit stetiger Dichte

$$\rho(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \phi(t) dt.$$

Beispiel. Seien $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ und $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ unabhängige Z.V.. Dann

$$Z = X^2 + Y^2 \sim \text{Exp}(1).$$

Zwei Methoden zu dass zeigen. Diese Beobachtung liefert eine sehr gute Methode zur Erzeugung einer Gaußschen Zufallsvariablen.

Lemma 9. (Box-Müller Methode) Sei Z, Θ unab. und s.d.

$$Z \sim \text{Exp}(1/2), \quad \Theta \sim \mathcal{U}([0, 2\pi]).$$

Setzen

$$X = Z^{1/2} \sin(\Theta), \quad Y = Z^{1/2} \cos(\Theta)$$

Dann X, Y unab. sind und $X \sim Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Satz 10. (Transformationssatz)

a) Eindimensionale: Sei $X: \Omega \rightarrow D \subseteq \mathbb{R}$ ein Z.V. mit absolut stetiger Verteilung, ρ_X die Dichte. Sei $\phi: D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar mit $\phi'(x) \neq 0 \forall x \in D$. Dann $\phi(X)$ hat Dichte

$$\rho_{\phi(X)}(y) = \rho_X(\phi^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} \phi^{-1}(y) \right| \mathbb{1}_{y \in \phi(D)}$$

b) Mehrdimensionale: Seien $S, T \subseteq \mathbb{R}^n$, $X: \Omega \rightarrow S$ eine Z.V. mit absolut stetiger Verteilung μ_X mit Dichte ρ_X . Sei $\psi: S \rightarrow T$ ein Diffeomorphismus C^1 mit $\det D\psi(x) \neq 0, \forall x \in S$. Dann ist die Verteilung von $\psi(X)$ absolut stetig (bzgl. Lebesgue) mit Dichte

$$\rho_{\psi(X)}(y) = \rho_X(\psi^{-1}(y)) |\det(D\psi^{-1}(y))| \mathbb{1}_{y \in \psi(D)}$$

wobei

$$\det(D\psi^{-1}(y)) = \det \left(\frac{\partial x_i}{\partial y_j} \right)_{i,j}, \quad x = \psi^{-1}(y).$$

Satz 11. Seien X_1, X_2, \dots Z.V. mit char. Fkt. ϕ_1, ϕ_2, \dots . Falls

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(t) = \phi(t), \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

wobei ϕ die char. Fkt. einer Z.V. X ist, dann $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \stackrel{\mathcal{D}}{=} X$.

Lemma 12. Sei $\phi \in C^2(\mathbb{R})$ mit $\phi(0) = 1$, $\phi'(0) = 0$. Dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\phi\left(\frac{t}{n^{1/2}}\right) \right]^n = \exp\left(-\frac{1}{2}\phi''(0)t^2\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Satz 13. (CLT) Seien X_1, X_2, \dots iid Z.V. mit $\mathbb{E}[X_k] = \mu$, $\text{Var}(X_k) = \sigma^2 < \infty$. Dann konvergiert

$$Z_n = \frac{1}{n^{1/2}\sigma} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu)$$

in Verteilung gegen eine $\mathcal{N}(0, 1)$ Z.V., d.h. für $s \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{1}{n^{1/2}\sigma} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu) \leq s\right) = \int_{-\infty}^s \frac{e^{-x^2/2}}{(2\pi)} dx.$$

